

**Тренировочная работа №5 по МАТЕМАТИКЕ****11 класс**

27 апреля 2023 года

Вариант МА2210511

(профильный уровень)

Выполнена: ФИО \_\_\_\_\_ класс \_\_\_\_\_

**Инструкция по выполнению работы**

Работа по математике состоит из двух частей, включающих в себя 18 заданий. Часть 1 содержит 11 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–11 записываются в виде целого числа или конечной десятичной дроби.

При выполнении заданий 12–18 требуется записать полное решение на отдельном листе бумаги.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

*Желаем успеха!***Справочные материалы**

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$


$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

**Часть 1**


**Ответом к каждому из заданий 1–11 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответы к заданиям в поле ответа в тексте работы.**

- 1 Через концы  $A$  и  $B$  дуги окружности с центром  $O$  проведены касательные  $AC$  и  $BC$ . Меньшая дуга  $AB$  равна  $80^\circ$ . Найдите угол  $ACB$ . Ответ дайте в градусах.



Ответ: \_\_\_\_\_.

- 2 В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает  $\frac{1}{3}$  высоты. Объём жидкости равен 15 мл. Сколько миллилитров жидкости нужно долить, чтобы полностью наполнить сосуд?



Ответ: \_\_\_\_\_.

- 3 На олимпиаде по обществознанию 300 участников разместили в трёх аудиториях. В первых двух удалось разместить по 120 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

Ответ: \_\_\_\_\_.

- 4 Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Труд» играет три матча с разными командами. Найдите вероятность того, что в этих играх «Труд» проиграет жребий ровно один раз.

Ответ: \_\_\_\_\_.


**5** Решите уравнение  $\frac{15}{x^2+6}=1$ . Если уравнение имеет больше одного корня, в ответе запишите меньший из корней.

Ответ: \_\_\_\_\_.

**6** Найдите значение выражения  $\log_{5,5} 2 - \log_{5,5} 11$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.

**7** На рисунке изображены график функции  $y=f(x)$  и касательная к нему в точке с абсциссой  $x_0$ . Найдите значение производной функции  $f(x)$  в точке  $x_0$ .



Ответ: \_\_\_\_\_.


**8** Коэффициент полезного действия (КПД) некоторого двигателя определяется формулой  $\eta = \frac{T_1 - T_2}{T_1} \cdot 100\%$ , где  $T_1$  — температура нагревателя (в кельвинах),  $T_2$  — температура холодильника (в кельвинах). При какой температуре нагревателя  $T_1$  КПД этого двигателя будет равен 25%, если температура холодильника  $T_2 = 330$  К? Ответ дайте в кельвинах.

Ответ: \_\_\_\_\_.

**9** Автомобиль выехал с постоянной скоростью 88 км/ч из города А в город В, расстояние между которыми равно 110 км. Одновременно с ним из города С в город В, расстояние между которыми равно 64 км, с постоянной скоростью выехал мотоциклист. По дороге он сделал остановку на 15 минут. В результате автомобиль и мотоцикл прибыли в город В одновременно. Найдите скорость мотоциклиста. Ответ дайте в км/ч.

Ответ: \_\_\_\_\_.

**10** На рисунке изображены графики функций  $f(x) = 5x + 9$  и  $g(x) = ax^2 + bx + c$ , которые пересекаются в точках А и В. Найдите ординату точки В.



Ответ: \_\_\_\_\_.

**11** Найдите наибольшее значение функции  $y = 19 + 30x - 4x\sqrt{x}$  на отрезке  $[23; 29]$ .

Ответ: \_\_\_\_\_.

## Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 12–18 используйте отдельный лист. Запишите сначала номер выполняемого задания (12, 13 и т. д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

12) а) Решите уравнение  $\frac{3 \operatorname{tg}^2 x - 1}{2 \cos x + \sqrt{3}} = 0$ .

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку  $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$ .

13) В правильной треугольной призме  $ABCA_1B_1C_1$  длина ребра основания равна 8, а длина бокового ребра равна 4.

а) Докажите, что сечение призмы плоскостью  $\alpha$ , проходящей через середину ребра  $AB$  перпендикулярно отрезку, соединяющему середины рёбер  $BC$  и  $A_1B_1$ , делит ребро  $AC$  в отношении 1:3, считая от вершины  $A$ .

б) Найдите площадь сечения призмы плоскостью  $\alpha$ .

14) Решите неравенство  $3^x \cdot 4^{\frac{1}{x}} > 18$ .

15) 15 января планируется взять кредит в банке на 9 месяцев. Условия его возврата таковы:

— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 5 % по сравнению с концом предыдущего месяца;

— со 2-го по 14-е число каждого месяца нужно внести один платёж для погашения долга;

— 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Известно, что пятый платёж равен 125 тыс. рублей. Найдите сумму всех платежей, которые будут выплачены банку в течение всего срока кредитования.

16) В треугольнике  $ABC$  проведены биссектрисы  $BM$  и  $CN$ . Оказалось, что точки  $B, C, M$  и  $N$  лежат на одной окружности.

а) Докажите, что треугольник  $ABC$  равнобедренный.

б) Пусть  $P$  — точка пересечения биссектрис этого треугольника. Найдите площадь четырёхугольника  $AMPN$ , если  $MN : BC = 2 : 3$ ,  $BN = 10$ .

17) Найдите все значения  $a$ , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{7^x - a} + \frac{a - 4}{\sqrt{7^x - a}} = 1$$

имеет ровно два различных корня.

18) Каждый из группы учащихся сходил в зоопарк или в музей, при этом возможно, что кто-то из них сходил и в зоопарк, и в музей. Известно, что в музее мальчиков было не более  $\frac{5}{12}$  от общего числа учащихся группы,

посетивших музей, а в зоопарке мальчиков было не более  $\frac{4}{7}$  от общего числа учащихся группы, посетивших зоопарк.

а) Могло ли быть в группе 20 мальчиков, если дополнительно известно, что всего в группе было 30 учащихся?

б) Какое наибольшее количество мальчиков могло быть в группе, если дополнительно известно, что всего в группе было 30 учащихся?

в) Какую наименьшую долю могли составлять девочки от общего числа учащихся в группе без дополнительного условия пунктов а и б?

[math100.ru](http://math100.ru)

Ответы на тренировочные варианты 2210509-2210512 (профильный уровень) от  
27.04.2023

	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>2210509</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>0,2</b>	<b>5,25</b>	<b>- 5</b>	<b>- 3</b>	<b>0,25</b>	<b>34,5</b>	<b>240</b>	<b>- 2</b>	<b>- 49</b>
<b>2210510</b>	<b>44</b>	<b>6</b>	<b>0,7</b>	<b>4,8</b>	<b>- 4</b>	<b>- 4</b>	<b>0,5</b>	<b>97</b>	<b>180</b>	<b>3</b>	<b>- 2</b>
<b>2210511</b>	<b>100</b>	<b>390</b>	<b>0,2</b>	<b>0,375</b>	<b>- 3</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1,75</b>	<b>440</b>	<b>64</b>	<b>39</b>	<b>269</b>
<b>2210512</b>	<b>128</b>	<b>336</b>	<b>0,1</b>	<b>0,375</b>	<b>- 5</b>	<b>- 1</b>	<b>- 1,25</b>	<b>650</b>	<b>51</b>	<b>41</b>	<b>236</b>

**Критерии оценивания заданий с развёрнутым ответом**

**12**

а) Решите уравнение  $\frac{3 \operatorname{tg}^2 x - 1}{2 \cos x + \sqrt{3}} = 0$ .

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие промежутку  $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$ .

**Решение.**

а) Перейдём к системе:


$$\begin{cases} \operatorname{tg}^2 x = \frac{1}{3}, \\ \cos x \neq -\frac{\sqrt{3}}{2}, \\ \cos x \neq -\frac{\sqrt{3}}{2}. \end{cases} \text{ откуда следует, что } \operatorname{tg} x = -\frac{1}{\sqrt{3}} \text{ или } \operatorname{tg} x = \frac{1}{\sqrt{3}} \text{ при условии}$$

Получаем  $x = -\frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbf{Z}$ , или  $x = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbf{Z}$ .

б) Отберём корни на отрезке  $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$

с помощью единичной окружности.

Получим числа  $\frac{11\pi}{6}; \frac{13\pi}{6}$ .



**Ответ:** а)  $-\frac{\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbf{Z}; \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbf{Z}$ ; б)  $\frac{11\pi}{6}; \frac{13\pi}{6}$ .

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте а. ИЛИ Получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта а и пункта б	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

**13**

В правильной треугольной призме  $ABC_1B_1C_1$  длина ребра основания равна 8, а длина бокового ребра равна 4.


а) Докажите, что сечение призмы плоскостью  $\alpha$ , проходящей через середину ребра  $AB$  перпендикулярно отрезку, соединяющему середины рёбер  $BC$  и  $A_1B_1$ , делит ребро  $AC$  в отношении 1:3, считая от вершины  $A$ .

б) Найдите площадь сечения призмы плоскостью  $\alpha$ .

**Решение.**


а) Пусть точки  $M, N, M_1$  и  $N_1$  — середины рёбер  $AB, BC, A_1B_1$  и  $B_1C_1$ . Четырёхугольник  $MNN_1M_1$  является квадратом, поэтому его диагонали  $MN_1$  и  $NM_1$  перпендикулярны и точкой пересечения делятся пополам.

Пусть точка  $P$  — середина  $BB_1$ , а точка  $O$  — центр грани  $ACC_1A_1$ . Прямая  $OP$  перпендикулярна плоскости  $MNN_1$ , поэтому прямая  $OP$  перпендикулярна прямой  $M_1N$ .



Прямая  $NM_1$  перпендикулярна прямым  $MN_1$  и  $OP$ , поэтому плоскость  $\alpha$  проходит через пересекающиеся прямые  $MN_1$  и  $OP$ .

Пусть прямые  $PM$  и  $AA_1$  пересекаются в точке  $K$ , а прямая  $OK$  пересекает рёбра  $AC$  и  $A_1C_1$  в точках  $F$  и  $E$  соответственно. Пятиугольник  $EN_1PMF$  — сечение призмы плоскостью  $\alpha$ .



Из равенства треугольников  $PBM$  и  $KAM$  следует, что  $AK = PB$ , поэтому  $A_1K = 4 + 2 = 6$ . Из подобия треугольников  $EA_1K$  и  $FAK$  следует, что

$$\frac{EA_1}{FA} = \frac{AK}{AK} = \frac{3}{1}, \text{ а } C_1E = FA, \text{ значит, } CF = EA_1 \text{ и } CF : FA = 3 : 1.$$

б) Плоскости  $ABC$  и  $\alpha$  пересекаются по прямой  $FM$ . Прямая  $M_1N$  перпендикулярна плоскости  $\alpha$ , следовательно, плоскости  $MN_1M_1$  и  $\alpha$  перпендикулярны. Значит, угол  $N_1MN$  — это линейный угол двугранного угла между плоскостями  $ABC$  и  $\alpha$ ,  $\angle N_1MN = 45^\circ$ . Пятиугольник  $TFMBN$  является ортогональной проекцией пятиугольника  $EN_1PMF$  на плоскость  $ABC$ . Имеем

$$S_{CNT} = S_{C_1N_1E} = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{2} S_{ABC}, \text{ и аналогично } S_{FMA} = \frac{1}{8} S_{ABC}.$$

$$\text{Значит, } S_{TFMBN} = \frac{3}{4} S_{ABC} = 12\sqrt{3} \text{ и } S_{EN_1PMF} = 12\sqrt{3} : \cos 45^\circ = 12\sqrt{6}.$$

**Ответ:** б)  $12\sqrt{6}$ .

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта $a$ , и обоснованно получен верный ответ в пункте $b$	3
Получен обоснованный ответ в пункте $b$ . ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта $a$ , и при обоснованном решении пункта $b$ получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта $a$ . ИЛИ При обоснованном решении пункта $b$ получен неверный ответ из-за арифметической ошибки.	1
Обоснованно получен верный ответ в пункте $b$ с использованием утверждения пункта $a$ , при этом пункт $a$ не выполнен	0
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
<i>Максимальный балл</i>	3

14

Решите неравенство  $3^x \cdot 4^{\frac{1}{x}} > 18$ .

**Решение.**

Прологарифмируем обе части неравенства по основанию 3:

$$x + \frac{1}{x} \log_3 4 > \log_3 18; \quad \frac{x^2 - x \log_3 18 + \log_3 4}{x} > 0;$$

$$\frac{x^2 - (2 + \log_3 2)x + 2 \log_3 2}{x} > 0; \quad \frac{(x - 2)(x - \log_3 2)}{x} > 0,$$

откуда  $0 < x < \log_3 2$  или  $x > 2$ .

**Ответ:**  $(0; \log_3 2); (2; +\infty)$ .

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного включением точек $\log_3 2$ и/или 2. ИЛИ Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

15

15 января планируется взять кредит в банке на 9 месяцев. Условия его возврата таковы:

— 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 5 % по сравнению с концом предыдущего месяца;

— со 2-го по 14-е число каждого месяца нужно внести один платёж для погашения долга;

— 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Известно, что пятый платёж равен 125 тыс. рублей. Найдите сумму всех платежей, которые будут выплачены банку в течение всего срока кредитования.

**Решение.**

Пусть сумма кредита равна  $S$ . По условию долг перед банком по состоянию на 15-е число должен уменьшаться до нуля равномерно:

$$S; \frac{8S}{9}; \dots; \frac{2S}{9}; \frac{S}{9}; 0.$$

Первого числа каждого месяца долг возрастает на 5 %, значит, последовательность размеров долга по состоянию на 1-е число такова:

$$1,05S; 1,05 \cdot \frac{8S}{9}; \dots; 1,05 \cdot \frac{2S}{9}; 1,05 \cdot \frac{S}{9}.$$

Таким образом, платежи должны быть следующими:

$$0,05S + \frac{S}{9}; \frac{8 \cdot 0,05S + S}{9}; \dots; \frac{2 \cdot 0,05S + S}{9}; \frac{0,05S + S}{9}.$$

$$\text{Пятый платёж составит } \frac{5 \cdot 0,05 \cdot S + S}{9} = \frac{1,25S}{9}.$$

Сумма всех платежей равна:

$$S + S \cdot 0,05 \left( 1 + \frac{8}{9} + \dots + \frac{2}{9} + \frac{1}{9} \right) = S \left( 1 + \frac{10 \cdot 0,05}{2} \right) = 1,25S.$$

Значит, банку будет выплачено  $125\,000 \cdot 9 = 1\,125\,000$  рублей.

**Ответ:** 1 125 000 рублей.


Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	2

**16** В треугольнике  $ABC$  проведены биссектрисы  $BM$  и  $CN$ . Оказалось, что точки  $B, C, M$  и  $N$  лежат на одной окружности.

- Докажите, что треугольник  $ABC$  равнобедренный.
- Пусть  $P$  — точка пересечения биссектрис этого треугольника. Найдите площадь четырёхугольника  $AMPN$ , если  $MN : BC = 2 : 3, BN = 10$ .

**Решение.**

а) Вписанные углы  $MBN$  и  $MCN$  опираются на одну и ту же дугу  $MN$  окружности, значит, эти углы равны. Поскольку  $BM$  и  $CN$  — биссектрисы углов  $ABC$  и  $BCA$ , получаем, что  $\angle ABC = 2\angle MBN = 2\angle MCN = \angle BCA$ , и, следовательно, треугольник  $ABC$  равнобедренный.



б) Пусть прямая  $AP$  пересекает сторону  $BC$  в точке  $K$ . Тогда  $AK$  — высота и медиана равнобедренного треугольника  $ABC$ . По свойству биссектрисы треугольника  $AM : MC = AB : BC = AC : BC = AN : NB$ . Значит, по обратной теореме Фалеса прямые  $MN$  и  $BC$  параллельны. Тогда  $\angle BMN = \angle CBM = \angle MCN$  и треугольник  $BMN$  равнобедренный,  $BN = MN$ .

По условию  $MN : BC = 2 : 3$ . Пусть  $BN = MN = 2a, BC = 3a$  (где  $a = \frac{10}{2} = 5$ ).

Поскольку  $AN : NB = AB : BC$ , получаем, что  $\frac{AN}{2a} = \frac{AN + 2a}{3a}$ , следовательно,

$$AN = 4a \text{ и } AB = 2a + 4a = 6a.$$

Из прямоугольного треугольника  $ABK$  находим

$$AK = \sqrt{AB^2 - BK^2} = \sqrt{36a^2 - \frac{9}{4}a^2} = a\sqrt{\frac{135}{4}} = \frac{3}{2}\sqrt{15}a.$$

Отрезок  $BP$  — биссектриса треугольника  $ABK$ , значит,

$$AP : PK = AB : BK = 6 : \frac{3}{2} = 4 : 1, \text{ следовательно, } AP = \frac{4}{5}AK = \frac{6}{5}\sqrt{15}a.$$

Прямая  $AK$  перпендикулярна прямой  $BC$ , прямая  $BC$  параллельна прямой  $MN$ , значит, прямая  $AP$  перпендикулярна прямой  $MN$ . Тогда

$$S_{AMPN} = \frac{1}{2}MN \cdot AP = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot \frac{6}{5}\sqrt{15} \cdot 5 = 30\sqrt{15}.$$

**Ответ:** б)  $30\sqrt{15}$ .

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта $a$ , и обоснованно получен верный ответ в пункте $b$	3
Получен обоснованный ответ в пункте $b$ . ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта $a$ , и при обоснованном решении пункта $b$ получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2
Имеется верное доказательство утверждения пункта $a$ . ИЛИ При обоснованном решении пункта $b$ получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте $b$ с использованием утверждения пункта $a$ , при этом пункт $a$ не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
<i>Максимальный балл</i>	3

**17** Найдите все значения  $a$ , при каждом из которых уравнение

$$\sqrt{7^x - a} + \frac{a - 4}{\sqrt{7^x - a}} = 1$$

имеет ровно два различных корня.

**Решение.**

Исходное уравнение имеет ровно два различных корня тогда и только тогда, когда уравнение

$$\sqrt{t - a} + \frac{a - 4}{\sqrt{t - a}} = 1$$

имеет ровно два различных положительных корня.

При  $t \leq a$  левая часть уравнения не определена, а при  $t > a$  уравнение принимает вид  $t - 4 = \sqrt{t - a}$ . При  $t < 4$  левая часть полученного уравнения отрицательна, а правая неотрицательна, поэтому полученное уравнение не имеет корней, меньших 4.

При  $t > a$  и  $t \geq 4$  получаем:  $t^2 - 8t + 16 = t - a$ ;  $t^2 - 9t + (a + 16) = 0$ .

Дискриминант полученного квадратного уравнения равен

$$81 - 4(a + 16) = 17 - 4a.$$

Значит, уравнение имеет ровно два корня при  $a < \frac{17}{4}$ .

При каждом из значений  $a < \frac{17}{4}$  графиком функции  $f(t) = t^2 - 9t + (a + 16)$  является парабола с ветвями, направленными вверх, и вершиной в точке  $(\frac{9}{2}; a - \frac{17}{4})$ . Пусть  $t_0$  — меньший корень уравнения  $f(t) = 0$ .

Поскольку  $4 < \frac{9}{2}$  и  $a < \frac{17}{4} < \frac{9}{2}$ , неравенства  $t_0 \geq 4$  и  $t_0 > a$  выполняются тогда и только тогда, когда  $f(4) \geq 0$  и  $f(a) > 0$ . Получаем:  $a - 4 \geq 0$  и  $a^2 - 8a + 16 > 0$ , следовательно,  $a > 4$ .

Таким образом, исходное уравнение имеет ровно два различных корня при

$$4 < a < \frac{17}{4}.$$

**Ответ:**  $4 < a < \frac{17}{4}$ .

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	4
С помощью верного рассуждения получено множество значений $a$ , отличающееся от искомого только включением точки $a = 4,25$	3
С помощью верного рассуждения получено множество значений $a$ , отличающееся от искомого только включением двух точек $a = 4, a = 4,25$ . ИЛИ Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом верно выполнены все шаги решения	2
Задача сведена к исследованию корней уравнения $t^2 - 9t + (a + 16) = 0$ при условиях $t > a$ и $t \geq 4$ для всех значений $a$	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4

**18** Каждый из группы учащихся сходил в зоопарк или в музей, при этом возможно, что кто-то из них сходил и в зоопарк, и в музей. Известно, что в музее мальчиков было не более  $\frac{5}{12}$  от общего числа учащихся группы,

посетивших музей, а в зоопарке мальчиков было не более  $\frac{4}{7}$  от общего числа

учащихся группы, посетивших зоопарк.

а) Могло ли быть в группе 20 мальчиков, если дополнительно известно, что всего в группе было 30 учащихся?

б) Какое наибольшее количество мальчиков могло быть в группе, если дополнительно известно, что всего в группе было 30 учащихся?

в) Какую наименьшую долю могли составлять девочки от общего числа учащихся в группе без дополнительного условия пунктов а и б?

**Решение.**

а) Если группа состоит из 7 мальчиков, посетивших только музей, 13 мальчиков, посетивших только зоопарк, и 10 девочек, сходявших и в музей, и в зоопарк, то условие задачи выполнено. Значит, в группе из 30 учащихся могло быть 20 мальчиков.

б) Предположим, что мальчиков было 21 или больше. Тогда девочек было 9 или меньше. Музей посетило не более 6 мальчиков, поскольку если бы их было 7 или больше, то доля мальчиков в музее была бы не меньше  $\frac{7}{7+9} = \frac{7}{16}$ , что больше  $\frac{5}{12}$ . Аналогично зоопарк посетило не более 12

мальчиков, поскольку  $\frac{13}{13+9} = \frac{13}{22} > \frac{4}{7}$ , но тогда хотя бы три мальчика не

посетили ни музей, ни зоопарк, что противоречит условию.

В предыдущем пункте было показано, что в группе из 30 учащихся могло быть 20 мальчиков. Значит, наибольшее количество мальчиков в группе — 20.

в) Предположим, что некоторый мальчик сходил и в музей, и в зоопарк. Если бы вместо него в группе присутствовало два мальчика, один из которых посетил только музей, а другой — только зоопарк, то доля мальчиков и в музее, и в зоопарке осталась бы прежней, а общая доля девочек стала бы меньше. Значит, для оценки наименьшей доли девочек в группе можно считать, что каждый мальчик сходил или только в музей, или только в зоопарк.

Пусть в группе  $m_1$  мальчиков, посетивших музей,  $m_2$  мальчиков, посетивших зоопарк, и  $d$  девочек. Оценим долю девочек в этой группе. Будем считать, что все девочки ходили и в музей, и в зоопарк, поскольку их доля в группе от этого не изменится, а доля в музее и в зоопарке не уменьшится.



По условию  $\frac{m_1}{m_1+d} \leq \frac{5}{12}$ ,  $\frac{m_2}{m_2+d} \leq \frac{4}{7}$ , значит,  $\frac{m_1}{d} \leq \frac{5}{7}$ ,  $\frac{m_2}{d} \leq \frac{4}{3}$ . Тогда

$\frac{m_1+m_2}{d} \leq \frac{43}{21}$ , поэтому для доли девочек в группе выполняется оценка

$$\frac{d}{m_1+m_2+d} = \frac{1}{\frac{m_1+m_2}{d}+1} \geq \frac{1}{\frac{43}{21}+1} = \frac{21}{64}.$$

Если группа состоит из 15 мальчиков, посетивших только музей, 28 мальчиков, посетивших только зоопарк, и 21 девочки, которые сходили и в музей, и в зоопарк, то условие задачи выполнено, а доля девочек в группе равна  $\frac{21}{64}$ .

**Ответ:** а) да; б) 20; в)  $\frac{21}{64}$ .

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получены верные ответы в пунктах <i>a</i> , <i>b</i> и <i>v</i>	4
Обоснованно получен верный ответ в пункте <i>v</i> , и обоснованно получен верный ответ в пункте <i>a</i> или <i>b</i>	3
Обоснованно получены верные ответы в пунктах <i>a</i> и <i>b</i> . ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте <i>v</i>	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте <i>a</i> или <i>b</i>	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
<i>Максимальный балл</i>	4